

Quale esito per questa lesione?

Rubrica [A colpo d'occhio](#)



POSSIBILI DIAGNOSI

1. Sutura con cicatrice deformante
2. Sutura senza cicatrice
3. Guarigione senza sutura
4. Guarigione con cianoacrilato
5. Necrosi del lembo

Quale esito per questa lesione?

DIAGNOSI CORRETTA

Guarigione senza sutura

A distanza di circa 12 ore la lesione appare in corso di spontanea risoluzione senza alcun intervento (**Figura**). Il trattamento delle lacerazioni traumatiche della lingua non è univocamente codificato e la scelta della strategia dipende dall'entità e posizione della lesione e dalla valutazione clinica individuale. La sutura richiede, soprattutto nel bambino piccolo, una sedazione o un'anestesia generale; in alternativa è stato sperimentato con successo l'uso locale di una "colla" di cianoacrilato, ma è dimostrato che anche il trattamento conservativo e la semplice attesa possono portare alla risoluzione spontanea della lesione.

Figura



Bibliografia

1. Patel A. Tongue lacerations. Br Dent J 2008;204:355
2. Kazzi MG, Silverberg M. Pediatric tongue laceration repair using 2-octyl cyanoacrylate (Dermabond®). J Emerg Med 2013;45:846
3. Ud-din Z, Aslam M, Gull S. Towards evidence based emergency medicine: best BETs from the Manchester Royal Infirmary. Should minor mucosal tongue lacerations be sutured in children? Emerg Med J 2007;24:123

(Contributo di: **Francesca Vaienti**, UO Pediatria, Forlì)